

Quick Guide

Beyond the PCR technology,
BIOFACT promises the progress for your research.



BioFACT™ dNTP Set(U) (Each 100 mM)

[Cat. No. DN107-40h]

Contents	DN107-40h
BioFACT™ 100 mM dATP	1 mL
BioFACT™ 100 mM dGTP	1 mL
BioFACT™ 100 mM dCTP	1 mL
BioFACT™ 100 mM dUTP	1 mL

Description

BioFACT™ 100 mM dNTP Set consists of four deoxynucleotides (dATP, dCTP, dGTP, dUTP), each at a concentration of 100 mM. The dNTP set is suitable for use in PCR, sequencing, fill-in, nick translation, cDNA synthesis, and TdT tailing reactions.

Feature

- Greater than 99% purity confirmed by HPLC
- Free of Human and E.coli DNA
- Stable after multiple freeze-thaw cycles
- Up to 95% of dNTPs remain in triphosphate form even after 7 weeks at room temperature.
- Up to 90% of dNTPs remain in triphosphate form after 30 cycles of PCR (1 min at 94°C; 3 min at 72°C)

Application

For use in all molecular biology applications, including PCR, real-time PCR, high fidelity and long PCR, LAMP-PCR, cDNA synthesis, RT-PCR, RDA, MDA, DNA labeling, and DNA sequencing.

Quality Control

- Functionally tested in PCR
- Greater than 99% purity of each component confirmed by HPLC
- Free of Endonuclease, exodeoxyribonuclease, ribonuclease
- Free of nicking activities

General Characteristics

dATP

C10H13N3O12P3Na3; MW = 557.2;
 λ_{max} =259 nm; $\epsilon=15.4\times10^3 M^{-1}cm^{-1}$ at pH 7.0;

dCTP

C9H13N3O13P3Na3; MW = 533.1;
 λ_{max} =271 nm; $\epsilon=9.1\times10^3 M^{-1}cm^{-1}$ at pH 7.0;

dGTP

C10H14N3O13P3Na3; MW = 573.2;
 λ_{max} =253 nm; $\epsilon=13.7\times10^3 M^{-1}cm^{-1}$ at pH 7.0;

dTTP

C10H14N2O14P3Na3; MW = 548.1;
 λ_{max} =267 nm; $\epsilon=9.6\times10^3 M^{-1}cm^{-1}$ at pH 7.0;

dUTP

C5H12N2O14P3Na3; MW = 534.1;
 λ_{max} =262 nm; $\epsilon=9.8\times10^3 M^{-1}cm^{-1}$ at pH 7.0;

Expiration Date : -20 ± 5 °C 보관 시 2년



Please contact us, if you have any question and need help.
T)1670-5695 www.bio-ft.com info@bio-ft.com

2016.04.01(설명서 개정일)



주의사항.

본 제품은 실험 전문 인력이 사용하도록 한다.

제품보증 및 책임사항

- 제품의 유효기간은 구입일로부터 **2년** 이다.
- 설명서에 나온 지침에 따라 제품을 사용하였을 경우에만 모든 제품의 결과를 보증한다.
- 실험자의 잘못된 사용이나 부주의로 인해 문제가 발생하였을 경우에는 교환이 되지 않는다.

안전과 및 응급조치 요령

- 눈, 호흡기, 피부 접촉을 피한다.
- 눈에 들어갔을 때 : 흐르는 물로 눈을 씻을 것.
- 자극이 자속되며 의사의 진료를 받을 것.
- 피부에 접촉시: 접촉된 부위를 비누와 물로 충분히 씻을 것. 자극이 자속되며 의사의 진료를 받을 것.
- 동상의 위험이 있으니 반드시 장갑 착용 후 사용할 것.

사용자 유의사항

- 유经济效益이 지난 제품의 사용을 금지한다.
- 냉동 제품을 자주 얼리고 녹이는 과정을 반복할 경우, 활성성이 저하될 수 있으므로 주의한다.
- 필요한 경우, 일정량을 분주하여 보관, 사용하도록 한다.
- 조작은 정해진 순서에 따라 정확히 하여야 하며, 키트는 개봉 후 즉시 사용한다.
- 분리된 검체DNA/RNA상태에 따라 상이한 결과를 보일 수 있다.
- 오염된 검체는 부정확한 결과를 나타낼 수 있으므로 주의한다.



알림.

- Genomic DNA / Plasmid DNA / Total RNA는 사용하는 Primer의 종류에 따라 다양한 농도로 사용할 수 있다.
- NTC (Non-Template Control)을 이용하여 실험 환경내의 오염을 확인하도록 한다.
 - 실험의 마지막 단계에서 적정량의 DNA / RNA template를 넣어 준다. NTC에는 template대신 RNase / DNase free water를 넣어 Negative control로 사용한다.



참고사항.

Template 종류에 따른 사용량 (PCR Cycles)

- Animal genomic DNA : 50 ng ~ 200 ng (30 ~ 35 cycles)
10 ng ~ 50 ng (30 ~ 40 cycles)
- Bacterial genomic DNA : 10 ng ~ 50 ng (30 ~ 35 cycles)
1 ng ~ 5 ng (30 ~ 40 cycles)
- Plasmid and Lamda DNA : 1 ng ~ 5 ng (30 ~ 40 cycles)



Troubleshooting Guide

(주) 바이오팩트 사용 시 먼저 check 해주세요.

- dNTP 농도 Check:** (주) 바이오팩트 dNTP Mix의 농도는 each 10mM입니다.
Reaction Vol. 50 μ L 기준 dNTP (each 10mM) 1 μ L를 사용합니다.
Enzyme 농도 Check: Reaction Vol. 50 μ L 기준 1.25 Unit를 사용합니다.
Band Helper™ 농도 조절: DNA 구조적인 문제 시 Final 0X~2X로 조절하여 사용합니다.



Low yield or No Band

농도 check

- 01. dNTP 농도 check**
적정량보다 초과 사용 시 substrate inhibition 작용으로 인해 target DNA를 생성하는 데 문제가 발생할 수 있습니다.
02. Band Helper™

온도/시간 check

- 01. Annealing Temperature(AT) check**
 $Tm=(A+T)X2 + (G+C)X4, AT=Tm(4-6°C)$ 이 산출법으로 설정 후에도 PCR이 되지 않으면 AT를 2°C 낮추어 진행합니다.
02. Pre-denaturation 온도 및 시간 (제품 Protocol 참조)
03. Extension time Check
일반적으로 0.5~1 min/kb로 설정. 단, Pfu 는 1~2 min/kb

template Primer Check

- 01. Primer degradation check**
Primer dilution 후 4°C에서 장기간 보관 시 분해되어 PCR에 영향을 줄 수 있습니다. 새로 dilution하거나 재작하여 사용합니다.
02. Starting template check
보관된 템플릿이 불량하거나 농도가 낮은 경우, quality가 낮을 경우 문제가 발생할 수 있습니다. 새로 prep하거나 사용량을 늘립니다.



Smear Band

농도 check

- 01. Enzyme 농도 check**
Reaction Vol. 50 μ L 기준 1.25 Unit을 사용하며, 계속 smear될 경우 Enzyme 양을 줄여가며 reaction합니다.

- 02. dNTP 농도 check**
Long PCR일 경우 적게 사용 시 smear될 수 있습니다.

- 03. Template 농도 check**
Template를 dilution하여 사용합니다.

PCR condition check

- 01. Extension time Check**
Extension time이 적정시간보다 길 경우, target size보다 긴 단편들이 형성되어 smear될 수 있습니다.
02. Cycle number check
cycle 수를 줄여서 PCR합니다.

온도/시간 check

- 01. Annealing Temperature(AT) check**
 $Tm=(A+T)X2 + (G+C)X4, AT=Tm(4-6°C)$ 이 산출법으로 설정 후에도 PCR이 되지 않으면 AT를 2°C 낮추어 진행합니다.
02. Pre-denaturation 온도 및 시간 (제품 Protocol 참조)



Non-Specific Band

TRY

- 01. Annealing Temperature(AT) 를 높여 PCR합니다.**
02. Band Helper™를 칠기합니다.
03. Hot Start Enzyme를 사용하여 PCR을 진행합니다.

